



SEXUALITA UŽIVATELŮ MARIHUANY

Mgr. Alexandra Schneider Hrouzková, Ph.D.

Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.

Prevalence užívání marihuany ČR

- Téměř třetina osob ve věku 15–64 někdy v životě užila konopné látky
- Odhad pravidelných uživatelů (min. 2x měsíčně) se pohybuje okolo tří set tisíc osob
- Vyšší míru užívání vykazují muži a mladí dospělí ve věku 15-34 let

Z přehledu výzkumů

- **Afrodiziakální účinky** – záleží na formě a dávce užití, návyku, vliv očekávání, nálady, settingu
- **Orgasmus** - neschopnost dosahování, tak jak by si uživatel přál + zlepšení prožitku
- **Erektilní funkce** – výsledky nejednoznačné
- Pocit **blízkosti**, intimacy, zvýšení intenzity smyslového vnímání, zejména prožívání **dotyku**
- Nižší věk koitarché, vyšší počet sex. partnerek
- Frekvence a závažnost rizikového chování roste s výčtem užívaných drog

Zaměřili jsme se:

- Popis vybraných charakteristik sexuálního chování
- Souvislosti frekvence užívání
- Souvislosti délky užívání
- Souvislosti s užíváním dalších psychoaktivních látek
- Souvislosti s užíváním tabáku
- Erektilní funkci dle IIEF-5

Soubor

- 392 respondentů, pravidelných heterosexuálních uživatelů marihuany užívajících marihuanu 1x týdně – denně
- Více než polovina – 5x týdně a více

Koitarché

- Věk prvního pohlavního styku nižší (16,1 let)
- Více než dvě třetiny uživatelů měly v době prvního pohlavního styku zkušenost s marihuanou

Počet sexuálních partnerek

- Prům. počet sexuálních partnerek 14,5,
nejčastěji 4
- Prům. počet příležitostných sex. partnerek 8,8,
nejčastěji 1 a 2

Sexuální partnerky a další užívané látky

Užívání dalších psychoaktivních látek souvisí s počtem sexuálních partnerek.

Uživatelé ze skupin MJ (LSD, extáze, halucinogenní houby, ketamin) a MT (pervitin, kokain) uvádějí vyšší počet sexuálních partnerek.

Sexuální potřeba a aktivita

- Potřeba sexuálního uspokojení a sexuální aktivita prům. 21 krát v měsíci, nejčastěji 30
- Nadpoloviční většina nezaznamenala **žádnou změnu potřeby** sexuálního uspokojení v souvislosti s užíváním marihuany
- Téměř čtvrtina dále uvedla, že se sexuální **potřeba a aktivita zvýšila**

Sexuální aktivita a užívání dalších látek

Užívání dalších psychoaktivních látek souvisí s měsíční sexuální aktivitou.

Uživatelé ze skupiny MT (pervitin, kokain) vykazují nižší měsíční sexuální aktivitu.

Předehra, soulož, orgasmus

- Nadpoloviční většina uživatelů vnímá délku přede hry i délku soulož e jako stejnou v porovnání s dobou před užíváním marihuany
- Třetina respondentů vnímá dobu trvání přede hry a soulož e v současnosti jako delší
- Orgasmus pro téměř dvě třetiny uživatelů (63,0 %) lepší a podstatně lepší

Změna pohlavního života

- Téměř polovina zaznamenala změnu pohlavního života k lepšímu od té doby, co užívají marihuanu
- 46 % uvedlo, že pohlavní život se nezměnil
- Nejčastější pozitivní změna - lepší prožitek orgazmu, následně zvýšená sexuální vzrušivost, zvýšená potřeba sexuálního vybití a zvýšená frekvence pohlavních styků

Sexuální spokojenost

Sexuální spokojenost v souboru uživatelů marihuany nesouvisí:

- s frekvencí užívání marihuany ($\chi^2 = 2,550$; p-hodnota = 0,636)
- s délkou užívání marihuany (p-hodnota = 0,579; Kruskal-Wallis test)
- s užíváním dalších psychoaktivních látek ($\chi^2 = 9,357$; p-hodnota = 0,154)

Sexuální poruchy

- Nejčastěji příliš velká potřeba sexu (10,2 %)
- Neschopnost dosáhnout vyvrcholení (7,4 %)
- Většina respondentů nikdy nezažila nedostavení se erekce a nedostavení se ejakulace při sexuálním styku, často tyto obtíže zažívají 2 % uživatelů

Poruchy ejakulace a délka užívání

Délka užívání marihuany souvisí s přítomností poruchy ejakulace.

Respondenti, u nichž se ejakulace při sexuálním styku někdy nedostavuje, užívají marihuanu delší dobu.

Prostituce

- Většina uživatelů marihuany nemá zkušenost s využitím komerčního sexu
- Respondenti, kteří měli pohlavní styk s prostitutkou, použili ve většině vždy kondom
- Naprostá většina uživatelů neposkytla nikdy sexuální služby za úplatu

Analýza vlivu užívání marihuany na erektilní funkci dle IIEF-5

- O určitý stupeň erektilní dysfunkce dle IIEF-5 se může jednat u **38,6 %** respondentů

Analýza vlivu užívání marihuany na erektilní funkci dle IIEF-5

- **Nebyla** zjištěna závislost mezi možnou přítomností určitého stupně erektilní dysfunkce dle IIEF-5 a vybranými parametry:
 - frekvence užívání ($\chi^2 = 4,87656$; p-hodnota = 0,08731)
 - délka užívání (p-hodnota = 0,601953; Kruskal-Wallis test)
 - užívání dalších psychoaktivních látek ($\chi^2 = 2,660358$; p-hodnota = 0,447006)
 - užívání tabáku ($\chi^2 = 1,14856$; p-hodnota = 0,699915)

Závěr

- Soubor uživatelů marihuany vykazuje jisté specifické rysy v oblasti sexuality – zejm. vyšší počet sexuálních partnerek, vyšší sexuální potřeba a aktivita, delší doba trvání soulože
- Většinou uváděn pozitivní dopad užívání na sexualitu, především na prožitek orgazmu
- Spokojenost se sexuálním životem nesouvisí s frekvencí ani s délkou užívání marihuany
- Nezjištěna závažná rizikovost v oblastech sexuálního chování a sexuálního zdraví



Děkuji za pozornost.

www.alexhrouzkova.cz

alex.hrouzkova@gmail.com